

LOHMANN BROWN-PLUS

LAYERS
LEGEHENNEN
PONDEUSES
PONEDORAS



PERFORMANCE DATA
LEISTUNGSDATEN
PRODUCTION EN CHIFFRES
DATOS DE PRODUCCIÓN



LOHMANN
TIERZUCHT

PERFORMANCE DATA

Egg Production	Age at 50% production	150–160 days
	Peak production	93–95 %
	Eggs per Hen Housed	
	in 72 weeks of age	312–317 (316)
	in 80 weeks of age	355–360 (358)
	in 85 weeks of age	378–383 (381)
Eggs Mass per Hen Housed	Eggs Mass per Hen Housed	
	in 72 weeks of age	19,5–20,5 kg (19,85 kg)
	in 80 weeks of age	22,3–23,3 kg (22,65 kg)
	in 85 weeks of age	24,0–25,0 kg (24,26 kg)
Average Egg Weight	Average Egg Weight	
	in 72 weeks of age	62,0–63,0 g (62,8 g)
	in 80 weeks of age	63,0–64,0 g (63,3 g)
	in 85 weeks of age	63,0–64,0 g (63,6 g)
Egg Characteristics	Shell colour	attractive brown
	Shell breaking strength	> 40 Newton
Feed Consumption	1 st –20 th week	7,4–7,8 kg
	Production	120–130 g/day
Body Weight	Feed conversion	2,3–2,4 kg/kg egg mass
Liveability	at 20 weeks	1,69–1,79 kg
	at the end of production	2,16–2,30 kg
Liveability	Rearing	97–98 %
	Laying period	90–93 %

LEISTUNGSDATEN

Eierproduktion	Alter bei 50% Produktion	150–160 Tage
	Produktionsspitze	93–95 %
	Eier je Anfangshenne	
	in 72 Lebenswochen	312–317 (316)
	in 80 Lebenswochen	355–360 (358)
	in 85 Lebenswochen	378–383 (381)
Eimasse je Anfangshenne	Eimasse je Anfangshenne	
	in 72 Lebenswochen	19,5–20,5 kg (19,85 kg)
	in 80 Lebenswochen	22,3–23,3 kg (22,65 kg)
	in 85 Lebenswochen	24,0–25,0 kg (24,26 kg)
Durchschnittliches Eigewicht	Durchschnittliches Eigewicht	
	in 72 Lebenswochen	62,0–63,0 g (62,8 g)
	in 80 Lebenswochen	63,0–64,0 g (63,3 g)
	in 85 Lebenswochen	63,0–64,0 g (63,6 g)
Eimerkmale	Schalenfarbe	attraktiv braun
	Schalenbruchfestigkeit	> 40 Newton
Futtermittelverbrauch	1.–20. Woche	7,4–7,8 kg
	Produktionsperiode	120–130 g/Tag
Körpergewicht	Futtermittelverwertung	2,3–2,4 kg/kg Eimasse
Körpergewicht	bei 20 Wochen	1,69–1,79 kg
	bei Produktionsende	2,16–2,30 kg
Lebensfähigkeit	aufzucht	97–98 %
	Legeperiode	90–93 %

PRODUCTION EN CHIFFRES

Production d'œufs	Age à 50% de la production	150–160 jours
	Pic de ponte	93–95 %
	Nombre d'œufs par poule démarrée	
	à 72 semaines d'âge	312–317 (316)
	à 80 semaines d'âge	355–360 (358)
	à 85 semaines d'âge	378–383 (381)
Masse d'œuf par poule démarrée	Masse d'œuf par poule démarrée	
	à 72 semaines d'âge	19,5–20,5 kg (19,85 kg)
	à 80 semaines d'âge	22,3–23,3 kg (22,65 kg)
	à 85 semaines d'âge	24,0–25,0 kg (24,26 kg)
Poids moyen des œufs	Poids moyen des œufs	
	à 72 semaines d'âge	62,0–63,0 g (62,8 g)
	à 80 semaines d'âge	63,0–64,0 g (63,3 g)
	à 85 semaines d'âge	63,0–64,0 g (63,6 g)
Caractéristiques d'œufs	Couleur de la coquille	roux agréable
	Résistance à la rupture	> 40 Newton
Consommation d'aliment	à 20 semaines	7,4–7,8 kg
	Période de production	120–130 g/jour
Poids vif	Indice de production	2,3–2,4 kg/kg d'œufs
Viabilité	jusqu'à 20 semaines	1,69–1,79 kg
	en fin de production	2,16–2,30 kg
Viabilité	Elevage	97–98 %
	Période de ponte	90–93 %

DATOS DE PRODUCCIÓN

Producción de huevos	Edad al 50% producción	150–160 días
	Pico de producción	93–95 %
	Huevos por gallina alojada	
	a las 72 semanas de edad	312–317 (316)
	a las 80 semanas de edad	355–360 (358)
	a las 85 semanas de edad	378–383 (381)
Masa de huevo por gallina alojada	Masa de huevo por gallina alojada	
	a las 72 semanas de edad	19,5–20,5 kg (19,85 kg)
	a las 80 semanas de edad	22,3–23,3 kg (22,65 kg)
	a las 85 semanas de edad	24,0–25,0 kg (24,26 kg)
Peso medio del huevo	Peso medio del huevo	
	a las 72 semanas de edad	62,0–63,0 g (62,8 g)
	a las 80 semanas de edad	63,0–64,0 g (63,3 g)
	a las 85 semanas de edad	63,0–64,0 g (63,6 g)
Características del huevo	Color de la cáscara	marrón uniforme
	Resistencia de la cáscara	> 40 Newton
Consumo de alimento	1ª–20ª semana	7,4–7,8 kg
	Período de producción	120–130 g/día
Peso corporal	Conversión alimenticia	2,3–2,4 kg/kg de huevo
Peso corporal	a las 20 semanas	1,69–1,79 kg
	al final de la producción	2,16–2,30 kg
Viabilidad	cria – Recría	97–98 %
	Período de puesta	90–93 %